



الحملة الوطنية
لمكافحة
فيروس كورونا
(COVID-19)



أسئلة وأجوبة حول اللقاحات



كيف تعمل اللقاحات؟

◆ تعمل اللقاحات على **تحفيز** الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة للفيروسات أو البكتيريا المسببة للأمراض المعدية، لإحداث استجابة مناعية، **تسهم في** **مجاهاة** الميكروبات عند التعرض لها مرة أخرى.





لماذا يجب أخذ اللقاح؟

◆ تعد اللقاحات إحدى أهم التدخلات الوقائية التي كان لها دوراً فعالاً في منع تفشي الأوبئة على مر العصور وحماية البشرية من تداعياتها وآثارها حيث تؤمن اللقاحات المناعة لمتلقيها مما يسهم في حماية المجتمع من عبء الأمراض والوفيات الناجمة عنها، لذا فإن الحرص على أخذ اللقاحات الموصى بها يعد من أهم الطرق لرفع معدلات المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة الأفراد من خطر انتشار الأوبئة.


مدك أمان وفعالية اللقاح؟

◆ اللقاحات آمنة بصورة عامة وفائدتها تفوق بعض الأعراض الجانبية المترتبة عليها. حيث يتم تصنيع اللقاحات من خلال عمل التجارب العلمية والتي **تمر بعدة مراحل** يتم خلالها التأكد من مأمونيتها في المراحل الأولى من التجارب، كما يتم أيضاً التأكد من فاعليتها لدى متلقي اللقاح **لحمايته من الإصابة** بعدوى المرض المستهدف بها.




هل هناك تسرع في تصنيع اللقاحات؟

◆ **إطلاقاً**، ولكن بفضل التعاون الدولي تم نشر الموروث الجيني للفيروس في شهر يناير بسبب تقدم التكنولوجيا وتم تصنيع اللقاحات من عدة دول وبطرق تقليدية وجديدة جمعياً **ضمن** **الاشتراطات** العلمية المتعارف عليها.



هل هناك آثار جانبيّة للقاح؟

◆ قد تحدث بعض الآثار الجانبية للقاحات قد تكون هذه الأعراض موضعية: كالألم والانتفاخ في موضع الحقن، وقد تكون أعراض عامة ومنها، الصداع، الشعور بالإعياء والحمى.



كيف تتعامل مع الأعراض الجانبية؟

◆ يتم التعامل مع الأعراض الجانبية عند حدوثها بحسب نوعها وشدتها، فالأعراض البسيطة كالآلم في موضع الحقن أو الصداع فمن الممكن استخدام مسكنات الألم لها، أما الأعراض المتوسطة أو الشديدة فيجب أخذ المشورة الطبية ليتم تشخيصها وعلاجها.



نصائح قبل أخذ اللقاح..

◆ أن لا يعاني الشخص الراغب في أخذ اللقاح من الحمى أو الأعراض المرضية المتوسطة أو الشديدة ليتمكن من أخذ اللقاح، وأن لا تكون لديه حساسية مفرطة من إحدى مكونات اللقاح.

◆ بالنسبة للنساء في سن الإنجاب: أن لا تكون المرأة حاملاً أو تخطط للحمل أو مرضعة ويفضل أن تستخدم أي مانع للحمل لمدة 3 أشهر على الأقل بعد أخذ اللقاح.

طريقة أخذ اللقاح؟

يعطى اللقاح من خلال الحقن في عضلة الذراع ويعطى في جرعتين يفصل بينها 21 يوماً

الفئات المسموح لها بأخذ اللقاح؟

لقاح كوفيد-19 يعطى للبالغين من عمر 18 عاماً فما فوق.


هل يمكن للمصاب مسبقاً أخذ اللقاح؟

◆ نعم يمكن للمصاب مسبقاً بالفيروس أخذ اللقاح بعد مضي 90 يوماً من الإصابة. أما العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة فيمكنهم أخذ اللقاح أياً كانت نسبة المناعة لديهم.



هل من يأخذ اللقاح معرضاً للإصابة ونقل العدوى؟

◆ تتفاوت الاستجابة المناعية بين الأشخاص،
فقد لا تكون المناعة الكافية لدى متلقي
اللقاح لحمايته من الإصابة بالفيروس ولكن **أخذ**
اللقاح قد يؤمن له الحماية من الإصابة
المتوسطة إلى الشديدة بالمرض، لذا **قد يصاب**
الشخص بفيروس كوفيد 19 وقد يكون
مصدراً لنقل العدوى للآخرين إذا أصيب به



هل يسمح للمتطوعين بالتجارب السريرية أخذ اللقاح؟

◆ ستكون هناك آليه متبعه للمتطوعين سيتم
الإعلان عنها قريبا




طريقة التسجيل

لأخذ اللقاح؟

◆ تم تخصيص موقع لتسجيل الاشخاص الراغبين بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد - 19" وذلك من خلال الرابط التالي:

healthalert.gov.bh



الحملة الوطنية
لمكافحة
فيروس كورونا
(COVID-19)



مَمْلَكَة الْبَحْرَيْنِ
KINGDOM OF BAHRAIN



#مَعاً_ننتصر