


الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا: تحديث بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

سبوتنيك	كوفيشيلد - استرازينيكا	فايزر-بيونتيك	سينوفارم
<p>18 عاماً فما فوق</p> <p>بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية</p> <p>تطعيم: (سبوتنيك) ✓ (فايزر -بيونتيك) ✓</p>	<p>18 عاماً فما فوق</p> <p>بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية</p> <p>تطعيم: (كوفيشيلد - استرازينيكا) ✓ (فايزر -بيونتيك) ✓</p>	<p>18 عاماً فما فوق</p> <p>بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية</p> <p>تطعيم: (فايزر -بيونتيك) ✓</p>	<p>18-39 عاماً</p> <p>بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية</p> <p>تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓</p> <hr/> <p>40 عاماً فما فوق ومن هم أقل من 40 عاماً ممن يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض نقص المناعة أو الأمراض المزمنة</p> <p>بعد شهر واحد من الجرعة الثانية</p> <p>تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓</p>



الحاصلين
على
جرعتين
من
التطعيم

بعد مرور **6 أشهر** من تاريخ الإصابة و مرور الفترة الزمنية
المحددة من أخذ الجرعة الثانية حسب كل تطعيم
ويمكن الحصول على الجرعة المنشطة بناءً على نوع التطعيم الذي
تم الحصول عليه قبل الإصابة بالفيروس



المتعافين
الحاصلين
على جرعتي
تطعيم